



Golf du Saint-Laurent

[illegible]

Table 3 (continued)

Types de cote

- Traverse de plage
- Rêche littorale à marais salés
- Filets enherbés
- Zone portuaire / gati

Milieu urbain

Eligible GR50+
NAO B3 compatible avec le
système central WGS B4

Mercator transformée rectilinéaire
2000 de T.
5 points de coordonnées plani-
métriques (3 000 000, 4 000 000, 5
000 000, 6 000 000, 7 000 000)

64° 10' nord

S 001 081

Tratado de la tigna de morcra por phaeomycetozoa
2 tomos de (protoplasmas al interior a finales 1955
1994, 1994, 1992) e 140.000 (1994, 2000)

Un tropecillo de xerita la descomposicion de residuos
diferentes tipos de cosec (junco) 2500

Reserva de colecciones de protoplasmas animales
1970 (cole de 140.000
2500 m (011 081)

Laboratoire des Phy-
tes des zones côtières

Laboratoire de Phy-
tes des zones côtières

Ministère des Re-
cherches et de l'Environnement

biologie et de gestion intégrée
QAR

biologie et de gestion intégrée
QAR

ressources naturelles
Eco

Carte de travail
ANNEXE K

Crédit
Recherche: Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée
des zones côtières,
Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Version 1.0 (mars 2008)

DAA > Daniel